

かっけつ 喀血

でお悩みの方に！

—もう、喀血は怖くない—



喀血って怖いですよ！病院に行っても止血剤の点滴だけがほとんどで、次にいつ喀血するか日々おびえながら過ごされている方が多いと思います。中にはお風呂にも入れず、外出もできない方がおられます。**超選択的気管支動脈塞栓術**ってご存知ですか？難しい名前ですけど止血率が高く、再喀血率の低い治療法です。この冊子ではその治療法についてお話いたします。



1. 喀血とは?? (人が血を吐くとき)



2. 喀血の原因疾患!



3. 喀血は止まります!!



4. 喀血の治療法!!!



5. 喀血の止まった患者様の声




1. 喀血とは??

(人が血を吐くとき)

口から血が出る状況は2種類あります。吐血と喀血です。歯槽膿漏などの口腔からの出血はべつになります。

ここでは吐血と喀血の違いを表します。

	吐血	喀血
出血場所	食道・胃など消化器から	気管・肺など呼吸器から
疾患名	胃潰瘍・十二指腸潰瘍など	気管支拡張症・結核など
血の色	主に静脈血(黒っぽい)胃液で酸化している	動脈血(真っ赤)咳を伴い気泡が混じっている
リスク	大量出血による血圧低下	窒息
治療法	クリッピング術 抗潰瘍薬の内服	止血剤の点滴・肺摘出・血管塞栓術

2. 喀血の原因疾患！

1. 気管支拡張症・特発性喀血症など

塞栓術による止血率は約97%もあり、血管塞栓に最も適している

2. 肺アスペルギル症・結核後遺症など

原因血管を止めても新しい血管が発達してくることがあり、複数回の血管塞栓術が必要になることがある。止血率約65%

3. 気管支動脈瘤・肺動静脈瘻など

動脈瘤は瘤内をコイルで詰めることにより破裂を防ぐ。

動静脈瘻は瘻内を詰めることにより脳梗塞などの合併症を防ぐ。



3. 喀血は止まります！！

前ページのとおり出血の原因となる血管を詰めれば、**喀血は止まるのです。**

ですが中には、別に新しい血管が発達して喀血を繰り返すことがあります。その場合は何度か塞栓術を繰り返すこともあります。また、血管によっては足・手からと2回に分けることもあります。

止血剤の点滴のように一時的ではなく、手術（肺切除）のように体に負担をかけない治療法です。




4. 喀血の治療法！！！！

気管支動脈塞栓術

足の付け根又は手首の動脈から2mmほどのカテーテル（管）を入れます。カテーテルの先を出血の原因となる血管に入れ、その中にさらに1mmほどのカテーテルを奥に進めます。金属コイルで血管内を詰め、出血を止めます。

以上極簡単な説明ですが、治療中は局部麻酔ですのでお話ができます。何でも聞いてください。足からの場合は6時間ほど安静が必要ですが、手首からですと終了後すぐに歩いていただくことも可能です。



5. 喀血の止まった患者様の声


お風呂に入ることが出来ました！全然大丈夫でしたが、止血のテープの跡がバツチリでした。もちろん先生に貼っていただいたバンドエイドはお守りのごとくそのままです。喀血は咳を伴うので咳がいつ、次の瞬間起こるかわからないのと同じで常にビクビクして過ごさないとはいけません。その恐怖はつらかったです。石川先生は身体的だけではなく精神的にも患者を癒して下さいますね。ありがとうございました。

特発性喀血症の患者様より

上記のように退院された患者様から多数のお返事をいただいております。スタッフで読ませていただき、あらためて喀血が患者様の生活を深刻に損なわせている事を痛感する毎日です。

一人でも多くの方の喀血を止めさせて頂くよう頑張っています！

この冊子では簡単な事しか表現できません。
詳しいことなどはお気軽にスタッフにお尋ね
下さい。



〒596-0003

岸和田市中井町1-12-1

TEL : 072-443-0081

医療法人盈進会岸和田盈進会病院

咯血・肺循環センター